

MIKROVIT MIEDŹ 80

Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny zawierający biodegradowalne związki kompleksujące, które przyspieszają pobieranie miedzi przez rośliny oraz ułatwiają łączne stosowanie nawozu z innymi agrochemikaliami. Nawóz szczególnie polecany w okresach intensywnego wzrostu roślin oraz w fazach krytycznych rozwoju roślin. Dokarmianie pozakorzeniowe nawozem MIKROVIT® MIEDŹ stanowi integralną część programów nawożenia upraw rolniczych i ogrodniczych.

Składniki pokarmowe wyrażone w [g/l lub g/kg]
Cu- 80

MIKROVIT MIEDŹ 80 TO:

- SKUTECZNE I EFEKTYWNE ZAOPATRZENIE ROŚLIN W MIEDŹ
- POPRAWA ZDROWOTNOŚCI ROŚLIN
- ZWIĘKSZENIE I POPRAWA JAKOŚCI PLONU

Stosować w postaci roztworu wodnego nalistnie: pojedynczo lub łącznie z innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG i/lub programami dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, zarejestrowany i przetestowany środek ochrony roślin w dawce zalecanej przez producenta. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Nawóz stosować w terminach i dawkach uwzględniających zapotrzebowanie różnych gatunków roślin na miedź w określonych fazach rozwoju.

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Można je modyfikować stosownie do indywidualnych warunków uprawowych. Ilość cieczy dostosować do techniki oprysku. Unikać zabiegów podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.

Instrukcja stosowania:

UPRAWY	ZALECANE TERMINY STOSOWANIA	JEDNORAZOWE DAWKI	
		MIKROVIT®MIEDŹ [l/ha]	ciecz użytkowa [l/ha]
ZBOŻA	I – krzewienie (BBCH 21–29); II – strzelanie w źdźbło (BBCH 30–39)	1–2	200–300

RZEPAK	I– wiosenne wznowienie wegetacji – tworzenie i wzrost pędów (BBCH 21–36); II – pąkowanie (rozwój pąków kwiatowych) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)		
KUKURYDZA	I – 8–10 liści (BBCH 18–19); II – od 12 liści (BBCH19) do końca fazy rozwoju źdźbła (BBCH 39)dopóki wysokość roślin pozwala jeszcze na zabieg opryskiwaczem		
BURAK	I– 4–8 liści (BBCH 14–18); II – 9 i więcej liści – rozwój rozety liściowej (BBCH 19–31)		
SŁONECZNIK	I– 4–6 liści (BBCH 14–16); następne 1–2 opryski co 10–14 dni		
JABŁONIE i inne drzewa owocowe	I – mysie ucho – zielony pąk (BBCH 53–56)	1–2	500–750
WINOROŚL	I– przed kwitnieniem (BBCH 53–55); II i III – po kwitnieniu (od BBCH 69) co 10–14 dni		
TRUSKAWKA	I– 3–5 rozwinięty liść (BBCH 13–15); II – na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe BBCH 55);III– pierwsze zawiązane owoce – wyraźnie widoczne nasiona na tkance dna kwiatowego (BBCH 73)	1–2	400–600
WARZYWA	I– tworzenie i rozwój liści (BBCH 13–19; następne zabiegi dostosować do wymagań gatunkowych		

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.