

## MIKROVIT MOLIBDEN 33

Nawóz dolistny - zapobiega występowaniu i skutecznie likwiduje niedobory molibdenu u roślin, do których dochodzi zwłaszcza na glebach o nieuregulowanym odczynie (pH poniżej 5,5)

Składniki pokarmowe wyrażone w [g/l lub g/kg]

N-50

Mo- 33

MIKROVIT MOLIBDEN 33 stosować w postaci roztworu wodnego lub łącznie z roztworem mocznika, siarczanu magnezu i sprawdzonym nawozem dolistnym (np. PLONVIT, SUPERVIT, TYTANIT), stosować do oprysku drobnokroplistego lub do podlewania roślin, wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

### Instrukcja stosowania:

ROŚLINY	ILOŚĆ ZABIEGÓW	TERMINY STOSOWANI A Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Roztwór zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania.	MOLIBDENIT[l/ha ]	ciecz użytkowa[l/ha ]
WARZYWA KAPUSTNE kalafior, brokuł, kapusta	1	rozsada na 7-10 dni przed wysadzeniem podlać rośliny 0,1% roztworem ( 0,1 l nawozu rozcieńczyć w 100 l wody)		
	1-3	uprawa w gruncie i pod osłonami: I oprysk – ok. 2 tyg. po wysadzeniu rozsady, II i III – co 10-14 dni	0,4-0,6	400-600

<b>WARZYWA STRĄCZKOWE</b>	1-2	zapobiegawczo - na glebach o pH<5,5 – w okresie intensywnego wzrostu, przed kwitnieniem	1	
<b>WARZYWA KORZENIOWE</b>	2	I – na początku intensywnego wzrostu korzenia spichrzowego; II – ok. 3 tygodnie przed zbiorem	1	
<b>WARZYWA CEBULOWE</b>	1	I - Faza 3-5 liści; II – początek wiązania cebul	1	
<b>DRZEWA OWOCOWE</b>	1	na glebach kwaśnych z dużą zawartością żelaza - wiosną, 1 oprysk po zawiązaniu owoców	0,5 - 1	500 -750
<b>POMIDOR</b>	1	interwencyjnie - przy objawach niedoboru molibdenu, opryskiwać rośliny 0,1% roztworem nawozu		
<b>RZEPAK</b>	jesień 1	dla poprawy zimotrwałości faza 4-8 liści	0,5 - 1	
	wiosna 1	od początku wzrostu pędów do pąkowania		
<b>ZBOŻA</b>	jesień 1	dla poprawy zimotrwałości faza 3-6 liści	1	200 - 300
	wiosna 1-2	Od fazy krzewienia do kłoszenia		
<b>MOTYLKOWE GRUBO- i DROBNONASIENN E</b>	2	I – 2-3 tygodnie po wschodach lub wznowieniu wegetacji wiosennej ; II – przed kwitnieniem lub po kolejnych pokosach	1	

<b>POZOSTAŁE UPRAWY ROLNICZE i OGRODNICZE</b>	1	zapobiegawczo - w celu uniknięcia niedoboru molibdenu	1	
	2 - 3	Interwencyjnie - przy objawach niedoboru molibdenu	1,5 - 2	