PLONVIT ZBOŻA

Nawóz dolistny dla zbóż. Roztwór nawozu azotowego N-15 (MgO-2) z mikroskładnikami pokarmowymi.

Składniki pokarmowe wyrażone w [g/l lub g/kg]

N	MgO	SO3	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
195	26	59	11,7	10,4	14,3	0,065	13

Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny, który dostarcza roślinom mikroelementy w proporcjach odpowiadających wymaganiom pokarmowym zbóż, a także magnez i azot poprawiający pobieranie i przyswajanie mikroelementów. Wzbogacony w formułę CHAAT zwiększającą przyswajalność składników pokarmowych oraz działającą biostymulująco – skutecznie odżywia zboża i pozytywnie oddziałuje na ich rozwój i plonowanie.

Istnieje możliwość mieszania nawozu PLONVIT ZBOŻA z większością agrochemikaliów stosowanych dolistnie w uprawach zbóż, co umożliwia włączenie go do kompleksowych programów zabiegów agrochemicznych (łączne stosowanie).

Stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.

Przy jednoczesnym stosowaniu wszystkich dopuszczalnych składników w zbiorniku opryskiwacza (w ½ do $^{2}/_{3}$ objętości wypełnionym wodą), przy włączonym mieszadle kolejno rozpuszczać siarczan magnezu, mocznik, rozcieńczony PLONVIT ZBOŻA (1 l nawozu w 5 l wody), inne nawozy dolistne (uprzednio oddzielnie rozcieńczone/ rozpuszczone w wodzie) oraz pestycyd według ich instrukcji stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania.

Instrukcja stosowania:

TERMINY STOSOWANIA NAWOZU		**JEDNORAZOWE DAWKI**	
		PLONVIT ZBOŻA [l/ha]	**ciecz użytkowa [l/ha]**
JESIEŃ	3–6 liść (BBCH 13–16)	1,5	200 - 300
WIOSNA	I – w okresie krzewienia (BBCH 22–29)	1–1,5	
	II – od początku strzelania w źdźbło (BBCH 30) do 40% wykształconego kłosa (BBCH 54)	1,5–2	

PLONVIT ZBOŻA można stosować także do nawożenia plantacji traw nasiennych w dawce 1-2 l/ha.